

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-11-66 580864

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-  
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.  
C. C. P. : DIJON 5.455-79

25 F.

Supplément n° 1 au Bulletin n° 74 - NOVEMBRE 1966

23 NOVEMBRE 1966

TRES IMPORTANT - DATE LIMITE DE RECEPTION DES ABONNEMENTS :

Nous informons nos fidèles abonnés que pour des raisons comptables, AUCUN ABONNEMENT NE SERA ACCEPTE APRES LE 28 FEVRIER 1967.

Si vous avez déjà renouvelé votre abonnement, veuillez ne pas tenir compte de cette circulaire.

V I G N E

UNE VIROSE, LA DEGENERESCENCE INFECTIEUSE (COURT-NOUE) :

La dégénérescence infectieuse se manifeste avec ampleur dans le vignoble de Bourgogne.

Dès 1947, les services du Ministère de l'Agriculture ont attiré l'attention des viticulteurs sur les dangers que représente cette maladie pour l'avenir du vignoble.

C'est un mal pernicieux dont le développement peut être lent, des années parfois, avant que les symptômes caractéristiques précédant la réduction de récolte, ne se manifestent. C'est la raison pour laquelle les vignerons, habitués aux attaques brutales parfois foudroyantes des maladies cryptogamiques (mildiou - oïdium - etc...) n'y ont prêté pendant longtemps aucune attention. Certains, de moins en moins nombreux d'ailleurs, contestent l'existence de cette maladie, attribuant les symptômes à une mauvaise conduite de la vigne, voir à une mauvaise alimentation du végétal.

Symptômes :

Cette virose se manifeste :

- sur feuilles : - par une dissymétrie (les deux moitiés de la feuille étant d'importance inégale par rapport à la nervure principale - déformation).
  - par une augmentation du nombre des nervures.
  - dents du limbe plus aigües,
  - sinus pétiolaire plus ouvert.
- sur rameaux : - méritalles courts
  - parfois aplatis - bifurqués (fasciation).
- sur grappes : - millerandage
  - coulure parfois totale dans les cas très prononcés.

Au stade ultime de la maladie, rabougrissement, nanisme des ceps, précédant la mort.

P. 160

Autre symptôme souvent confondu avec la chlorose - qui est une maladie physiologique - la panachure.

Le jaune de la panachure est plus vif, plus franc que celui de la chlorose qui est plus pâle, plus blanc, et aussi plus généralisé dans le limbe. La panachure peut parfois n'affecter qu'une portion de la feuille sous forme de plaques et aussi sous forme de points (mosaïque).

Agents vecteurs :

Il est à peu près certain que les contaminations se font de cep à cep par piqûres des racines par certaines espèces de nématodes se trouvant dans le sol.

Moyens de lutte :

Il n'existe pas de méthode curative, seuls des moyens préventifs peuvent être utilisés ; ils résident :

- dans la désinfection des sols avant plantation, par produits fumigants (type Dichloropropane - Dichloropropène (D.D.) - etc...).

- dans certaines conditions de températures et de respect de délai : 6 à 12 mois entre la désinfection et la plantation.

- dans l'utilisation pour la replantation, de racinés greffés sélectionnés et indemnes de dégénérescence infectieuse. Il ne servirait à rien en effet de procéder à la désinfection des sols si les plants destinés à la plantation n'offraient aucune garantie quant à leur état sanitaire.

Cette courte note, très incomplète, a pour seul but d'attirer l'attention des viticulteurs sur cette grave maladie. Pour plus amples renseignements, s'adresser à la Station d'Avertissements Agricoles de Bourgogne-Franche-Comté.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés  
des Avertissements Agricoles.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :  
H. SOULIE.

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté  
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.